

コロンフォート® 内用懸濁液25%を服用される方へ

コロンフォート内用懸濁液25%は、大腸CT検査を行う前に、
3回の食事の後に服用することにより、腸管組織と腸管の内容物を明確に区別して、
大腸に病気があるかどうかを調べやすくするためのお薬です。

■お名前 様

■検査日 年 月 日(曜日) ■来院時間 時 分

服用に際して

検査を受ける前に次のような方はお申し出ください。

- | | |
|------------------|------------|
| ・糖尿病や腎臓病などの持病がある | ・胃や腸の調子が悪い |
| ・アレルギー体質 | ・便秘がち |


◎検査前日から検査前までの食事は、医師の指示に従って、消化のよいものとしてください。
特に、以下の食材は避けてください。

【食べてはいけない食材】海藻、きのこ、纖維の多い野菜・果物類など


服用の方法

- ◎医師の指示に従って、検査予定時間に応じて検査前日から検査前までの
指定された食事の後に服用してください。
- ◎服用前によく振ってから、食後すぐに服用してください。
- ◎貯法:凍結を避け、室温(1~30°C)で保存してください。

服用例① [午前検査]



服用例② [午後検査]



注意事項

次の症状があらわれた場合は、がまんせずに直ちに服用を中止し、
医師、看護師、薬剤師等に連絡して、すみやかに受診してください。

- | | | | | |
|---------|-----------|--------|---------|---------|
| ・吐き気がする | ・吐いた | ・お腹が痛い | ・顔が青ざめる | ・めまいがする |
| ・寒気がする | ・じんましんが出る | ・息苦しい | ・顔がむくむ | など |

連絡先：